

Whooping cough is very contagious and dangerous for babies. Babies can catch this disease from others who may be sick, so you must take extra steps to protect your baby. You must also learn to recognize early symptoms so you can get treatment for your baby immediately. It is vital to start your baby's immunizations at 2 months of age. Your baby will need several doses before they are fully protected.

**What are the symptoms?**

At first, your baby may have a runny nose or congestion, sneezing, and a mild cough.

**After one to two weeks:**

- Severe coughing over and over.
- After a coughing fit, children gasp for air, making a whooping sound. (Babies may not make this sound).
- Coughing makes breathing, eating, drinking, or sleeping hard. It gets worse at night.
- Difficulty breathing while coughing.
- Coughing fits that last six weeks or longer.

**How does whooping cough spread?**

Someone can spread the disease even when they only have cold symptoms spreads through the air when a person breathes, coughs, or sneezes.

**How can I protect my child?**

- Keep newborns away from anyone with cold symptoms.
- Take your child to get their vaccines.
- Be sure that everyone who has contact with your baby has had the DTap vaccine.
- Always talk with your doctor when you have questions.

**When should my child get the vaccine?**

Children and babies should get 5 doses of the DTaP vaccine at the following ages:

1st dose	2 months
2nd dose	4 months
3rd dose	6 months
4th dose	Between 15-18 months
5th dose	Between 4-6 years of age

Pre-teens, teens, adults and pregnant women should get the Tdap vaccine at the following ages:

Pre-teens	11 years of age
Teens and Adults	If you did not get the vaccine at age 11
Pregnant women	Between 27 and 36 weeks of thier pregnancy

La tos ferina es muy contagiosa y peligrosa para los bebés. Los bebés pueden contraer esta enfermedad de otras personas que puedan estar enfermas, por lo que usted debe tomar medidas adicionales para proteger a su bebé. También debe aprender a reconocer los primeros síntomas para poder recibir tratamiento para su bebé de inmediato. Es vital iniciar las vacunas de su bebé a los 2 meses de edad. Su bebé necesitará varias dosis antes de estar completamente protegido.

**¿Cuáles son los síntomas?**

Al principio, su bebé puede tener secreción nasal o congestión, estornudos y una tos leve.

**Después de una o dos semanas:**

- Tos intensa que se repite una y otra vez.
- Después de un ataque de tos, los niños jadean para tomar aire haciendo un ferina sonido. (Es posible que los bebés no produzcan este sonido).
- La tos no les permite respirar, comer, beber o dormir normalmente. La situación empeora por la noche.
- Dificultad para respirar durante la tos.
- Ataques de tos que se prolongan por seis semanas o más tiempo.

**¿Cómo se contagia la tosferina?**

Una persona puede transmitir la enfermedad cuando todavía tiene solo síntomas de un resfrío. Se propaga por el aire cuando una persona respira, tose o estornuda.

**¿Cómo puedo proteger a mi hijos?**

- Mantenga a los recién nacidos alejados de cualquier persona que tenga síntomas de resfrío.
- Lleve a sus hijos a vacunarse.
- Asegúrese de que todas las personas que tengan contacto con su bebé hayan recibido la vacuna DTaP.
- Siempre hable con su médico si tiene alguna pregunta.

**¿Cuándo debería vacunarse mi hijo?**

Los niños y bebés deben recibir 5 dosis de la vacuna DTaP a las siguientes edades:

1ª dosis	2 meses
2ª dosis	4 meses
3ª dosis	6 meses
4ª dosis	entre los 15 y los 18 meses
5ª dosis	entre los 4 y los 6 años

Preadolescentes, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap:

Pre-adolescentes	11 años de edad
Adolescentes y Adultos	si no recibió la vacuna a la edad de 11 años
Mujeres embarazadas	entre 27 y 36 semanas de embarazo