

Earaches in children are very common and can be very painful. The pain can be felt in the ear or around the ear.

The most common earaches are caused by:

- An ear infection
- Swimmers Ear
- A recent injury to the ear
- Earwax
- Changes in air pressure

What are the symptoms my child may have?

- Pulling at their ear
- Cry more often than usual or seem very irritated
- Have ear drainage
- Have some hearing loss
- Have a fever
- Ear pain

How can I treat my child's earaches?

- Place a cold pack on the outer ear for about 20 minutes
- Ear drops from the drug store or grocery store
- Pain medicines like acetaminophen or ibuprofen

When should I take my child to the doctor?

- If your child has a fever
- If the ear pain gets worse
- If you see pus or blood draining from the ear
- If the ear is swollen or has redness behind the ear
- If symptoms do not get better within 24 to 48 hours

What to expect at a doctor's visit?

Your child's doctor will check your child's ears to see if there is an infection causing the pain. If there is an infection present, the doctor may recommend antibiotics. Your child's doctor may also prescribe antibiotic drops that may contain medicine for pain. Make sure your child finishes all antibiotics as prescribed.

Los dolores de oído en los niños son muy comunes y pueden resultar muy dolorosos. El dolor se puede sentir en el oído o alrededor del oído.

Los dolores de oído más comunes son causados por:

- Una infección de oído
- Oreja de nadador
- Una lesión reciente en el oído
- Cera en el oído
- Cambios en la presión del aire

¿Cuáles son los síntomas que mi hijo puede tener?

- Se tirona la oreja
- Llora con más frecuencia que lo normal o se lo ve muy irritable
- Le sale líquido del oído
- Presenta algún grado de pérdida de la audición
- Tiene fiebre
- Dolor de oído

¿Cómo puedo tratar los dolores de oído de mi hijo?

- Coloque una compresa fría en el oído externo durante unos 20 minutos
- Gotas para los oídos de la farmacia o del supermercado
- Medicamentos para el dolor como paracetamol o ibuprofeno

¿Cuándo debo llevar a mi hijo al médico?

- Si su hijo tiene fiebre
- Si el dolor de oídos empeora
- Si observa pus o sangre que salen del oído
- Si el oído está inflamado o hay enrojecimiento detrás de la oreja
- Si los síntomas no mejoran dentro de 24 a 48 horas

¿Qué esperar en una visita al médico?

El médico le revisará los oídos a su hijo para ver si la causa del dolor se debe a la presencia de una infección. Si hay una infección, es posible que el médico le recomiende tomar antibióticos. También puede recetarle gotas antibióticas que pueden contener analgésico. Asegúrese de que su hijo termine todos los antibióticos de acuerdo con las indicaciones del médico.